

¿Qué tengo que saber acerca de Xarelto?

- ◆ Xarelto hace la sangre más fluida, lo que previene la formación de coágulos de sangre.
- ◆ Debe tomar Xarelto exactamente como el médico se lo haya indicado. Para asegurar una protección óptima frente a la formación de coágulos, **no deje de tomar nunca una dosis.**
- ◆ No deje de tomar Xarelto sin consultar antes con su médico ya que esto aumentaría el riesgo de que se formen coágulos de sangre.

- ◆ Informe a su médico de cualquier otro medicamento que esté tomando, ha tomado recientemente o vaya a empezar a tomar, antes de tomar Xarelto.
- ◆ Diga a su médico que está tomando Xarelto antes de una intervención quirúrgica o de un procedimiento invasivo

¿Cuándo debo pedir consejo al médico?

Si toma un anticoagulante como Xarelto es importante que conozca sus posibles efectos secundarios. El efecto secundario más frecuente es el sangrado. No empiece

a tomar Xarelto si sabe que tiene riesgo de presentar un sangrado sin hablarlo antes con su médico.

Dígale inmediatamente al médico si usted tiene algún signo o síntoma de sangrado, como por ejemplo

- ◆ dolor
- ◆ hinchazón o molestias
- ◆ dolor de cabeza, mareos o debilidad
- ◆ moratones anormales, sangrado por la nariz, las encías o cortes que tardan mucho en dejar de sangrar
- ◆ flujo menstrual o sangrado vaginal más abundante de lo normal

- ◆ sangre en orina, que puede ser de color rosado o marrón, deposiciones de color rojo o negro
- ◆ tos con sangre o vómitos de sangre o de un material que tiene aspecto de grumos de café

¿Cómo debo tomar Xarelto?

- ◆ Para garantizar una protección óptima, Xarelto
 - 2,5 mg puede tomarse con o sin alimentos.
 - 10 mg puede tomarse con o sin alimentos.
 - 15 mg debe tomarse con alimentos.
 - 20 mg debe tomarse con alimentos.

8S165503 ES

Tarjeta de información para el paciente



Xarelto® 2,5 mg
Xarelto® 10 mg
Xarelto® 15 mg
Xarelto® 20 mg

- ◆ Lleve siempre consigo esta tarjeta
- ◆ Muestre esta tarjeta a todos los médicos o dentistas antes de recibir otro tratamiento

Estoy recibiendo tratamiento anticoagulante con Xarelto (rivaroxaban)

Nombre: _____	Otros medicamentos / afecciones: _____
Dirección: _____	_____
_____	_____
_____	_____
Fecha de nacimiento: _____	Peso: _____
_____	_____

En caso de urgencia, por favor, avisen a:

Nombre del médico: _____

Número de teléfono del médico: _____

Sello del médico: _____

Por favor, notifiquen también a:

Nombre: _____

Teléfono: _____

Parentesco: _____

Información para el profesional sanitario:

- ◆ No deben utilizarse los valores de INR ya que no son una medida válida de la actividad anticoagulante de Xarelto.



ES 1